

Die Lobi inferiores
des
Teleostier und Ganoidengehirns.

INAUGURAL-DISSERTATION
DER HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT
DER
UNIVERSITÄT BASEL
ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE
VORGELEGT
VON
J. J. DAVID aus BASEL.

BASEL
Druck der Schweiz. Verlags-Druckerei
1892.

Die Lobi inferiores
des
Teleostier und Ganoidengehirns.

INAUGURAL-DISSERTATION

DER HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

DER

UNIVERSITÄT BASEL

ZUR ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

VORGELEGT

VON

J. J. DAVID aus BASEL.

BASEL

Druck der Schweiz. Verlags-Druckerei

1892.

Die in Klammern in den Text eingefügten Zahlen
beziehen sich auf die entsprechenden Nummern des Litteratur-
verzeichnisses.

MEINER
LIEBEN MUTTER
GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548828_0090

Die vorliegende Untersuchung wurde 1891/92 im zweiten anatomischen Institut der Universität Berlin unternommen. Sie entsprang aus dem Verlaufe mehrerer, mit besonderer Berücksichtigung der neueren technischen Methoden über das Centralnervensystem der niederen Wirbeltiere unternommenen Studien. Da sich hiebei in mehreren Teilen des Fischgehirns gute Resultate ergeben und besonders in basalen Teilen Strukturen von unerwarteter und bis jetzt unbekannter Art gezeigt hatten, schien eine nähere Verfolgung derselben wohl lohnend zu werden.

Es wurde vorerst eine Species (*Leucisc. erythrophthalmus*) eingehend histologisch untersucht. Immer mehr trat dabei als Ziel hervor, womöglich die nervösen Faserbahnen, die zahlreich jene Teile durchziehen, bis an ihre Enden zu verfolgen, und genau die zu ihnen gehörenden Zellen und die Relationen zwischen denselben zu ergründen. Bei der Schwierigkeit dieser Aufgabe, die überhaupt nur mit ganz speziellen Methoden ausführbar wird, ist mir das bis jetzt nur teilweise gelungen.

Als zur Bearbeitung weiterer Species geschritten wurde, zeigten sich an Bau und Lage der *Lobi inferiores* so mannigfaltige Verschiedenheiten, dass mit der Zeit auch ein Teil größerer Morphologie in den Rahmen der Arbeit aufgenommen wurde. Um so mehr da manche Beziehungen zu benachbarten Gehirnteilen bloß auf Grund minutiöser Untersuchung kleiner Gebiete erforscht werden können. Erst wenn wir jede Stelle mehrerer Gehirne morphologisch genau definiert haben, kommen wir durch Vergleichung zu jenem wichtigen Postulate vergleichender Anatomie, die zur Beurteilung phylogenetischer Verhältnisse wichtigen Kriterien vom Unwesentlichen zu sondern.

Ferner ist auch zu hoffen, auf diese Weise dem Verständnis der morphologischen Substrate der Gehirnlocalisation und Faserassociation näher zu kommen.

Durch Messungen einzelner Gehirnteile und Berechnung ihres gegenseitigen Verhaltens, hoffte ich endlich zu einer Wertung morphologisch (und natürlich auch physiologisch) differenzierter Parteen zu kommen.

Als Material diente mir zuerst unsere Plötze, die vielfältig macroscopisch und microscopisch untersucht wurde. Daran schlossen sich die andern auf dem Berlinermarkt zu findenden Fische. In den letzten Monaten lieferte das Berlineraquarium ein zwar wertvolles, aber nicht immer im besten Zustande anlangendes Material. Als sich endlich der Wunsch herausstellte, mehrere exotische Specien macroscopisch nachzusehen, wurden mir von den Herren Geheimrat *Moebius* und Dr. *Hilgendorf* Exemplare des Naturwissenschaftlichen Museums zur Verfügung gestellt

Folgende Schnittserien liegen den Untersuchungen zu Grunde.

Gehirn von	Schnitttrichtung	Färbung
Leuciscus	horizontal	Weigert
"	transvers.	Carmin und bleu de Lyon
"	sagittal.	Pal.
"	transvers.	Hämatoxylin
"	"	Golgi
Perca fluviatilis	"	Hämatoxylin
" "	sagittal.	Weigert
" "	horizontal	Hämatoxylin + Eosin
Forelle	transvers.	Pal
"	"	Weigert
Cyclopterus lumpus	sagittal.	"
Tinca	"	"
Sargus ovis	"	Carmin + Picrinsäure
Accipenser ruth.	transvers.	Carmin + bleu de Lyon
Engraulis	"	Hämatoxylin + Eosin
"	horizontal	"
Gadus call.	transvers.	Weigert
Gasterosteus	"	"
Anguilla	sagittal.	"
Leucopsarion	horizontal	Carmin
"	transvers.	"

Zur Technik ist folgendes zu bemerken:¹⁾ Zur Härtung diente Müller'sche Flüssigkeit, und ein Gemisch von Picrinosmiumsalpetersäure. Gefärbt wurde mit Borax-, Picrin- und Alauncarmin, Haematoxylin und den gebr. Nachfärbungen.

Besonders angelegen liess ich mir aber das Studium der Silberimprägnation sein; es wurde sowohl der Golgis, Fusaris und R. y. Cajals Modification angewandt. Gute Resultate verdanke ich der Anwendung von Wärme. Durch Zufügen einiger Krystalle von Kali bichr. zu der Fixirflüssigkeit schien die Färbung vollkommener zu werden. Zur Verhütung peripherischer Niederschläge leistete mir Bestreichung der zu untersuchenden Teile mit Blut einige Dienste.

Die Schnittdicke wurde gewählt für

Embryonen	5—15 μ
Gef. Präparate	15—20 μ
Präparate zur Darstellung von Fasern	50—60 μ

Auch die Macerations- und Belloncis Osmium Methode wurden angewendet. Letztere erwies sich zur Führung von Schnitten ungeeignet.

Die Zeichnungen wurden teils mit dem *His'schen*, teils mit *Abbés* Zeichnungsapparat angefertigt. Ausserdem wurde nach der *Born-Strasser'schen* Methode in Wachs modelliert, und so das Gehirn von Embryonen reconstruirt.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. *Hertz* und Dr. *Burckhardt* für Anleitung zur Technik, Ueberlassung von Material und sonstige Anregung und Unterstützung in meinem Studiengange meinen verbindlichen Dank auszusprechen, ebenso Herrn Geheimrat *Moebius* und Dr. *Hilgendorf* für die Benützung des Materials des naturwissenschaftlichen Museums.

¹⁾ Was das Embryonenmaterial anbelangt, so sei auf pag. 41 verwiesen.

Litteratur.

Von den älteren Hirnforschern begnügten sich nur Wenige mit Aufzeichnung und Benennung der einzelnen Teile; meist ging das Aufsuchen der Homologien mit der Beschreibung Hand in Hand. Später wurde die histologische Struktur, deren wichtigstes Element der complizierte Verlauf der Fasern ist, immer mehr berücksichtigt; und endlich gewinnt in den letzten Jahren die Untersuchung an phylogenetischem Interesse, seit von mehreren Seiten der Versuch gemacht ist, eine Ableitung des Wirbeltiergehirns vom Arthropodennervensystem plausibel zu machen und diese Transformation histologisch zu erhärten. (Litteratur-Verzeichnis 32, pag. 388—419.)

In Bezug auf die Deutung war besonders das Zwischenhirn seit jeher das schwierige Problem. Speciell seine basalen Teile, die bei den Fischen mächtig aus der Flucht des Hirnbodens hervorgewölbt sind, wurden im Laufe der Hirnforschung schon in die meisten der „fünf Bläschen“ verlegt; ich stelle hier ihre Synonyma zusammen:

Lobi inferiores: *Gottsche, Baudelot, Fritzsche* etc.

Lobi infundibuli: *Müller, Goronowitsch* etc.

Hypoaria: *Sanders, Herrick*.

Thalamus opticus: *Cuvier, Serres*.

Lobi reniformia: *Klaatsch* und andere.

Meckel sieht in ihnen aus der Lage gebrachte (also heruntergerutschte) Vierhügel. Am längsten hielt sich die Auffassung als corpora mamillaria; vertreten wurde dieselbe durch *Vicq d'Azyr, Tiedemann, Treviranus* (3), *Philipeaux* und *Vulpian* (7), *Fritsch*. Zur Kritik dieser An-

sichten vergleiche pag. 44 des vergleichenden anatomischen Teils. Beschreibung der äusseren Form, die sehr variiert, gaben *Gottsche* und *Baudelot* (5). Letzterer scheint auch zum ersten Mal die in die betreffenden Gebilde eintretenden Fasern gesehen zu haben und zwar bei dem für macroscopische Untersuchung dieser Teile sehr günstigen Häring.

Fritsch, um nun zu der Reihe der histologischen Untersuchungen überzugehen, gab eingehende Schilderungen des Opticusverlaufs, machte Angaben über den runden Kern; beschrieb gut, deutete aber vieles falsch.

Sanders erwähnte beiläufig die Struktur der L. inf. als die eines „inextricable net work“, sah auch, dass die Zellen „pyriform und an der Periferie häufiger als im Centrum sind.“ (10.)

Mayser gab im Jahr 1882 eine vorzügliche Bearbeitung des Knochenfischgehirns. Das Gebiet der L. inf. ist zwar auf *Maysers* Zeichnungen meistens weiss gelassen, doch gab er folgende Bahnen an, die er in dieselben eintreten sah: Ein hinteres Bündel: Tract. cerebelli ad C. inf. Comm. horizontalis *Fritsch* s. Comm. transversa *Meynert*. (14.)

Durch *Maysers* histologische sowie *Rabl-Rückhardts* embryologische Untersuchungen trat jene Reform der vergleichenden Hirnanatomie ein, die seitdem allgemein angenommen ist und zu noch weiteren Resultaten zu führen verspricht. (17, 18.)

Chatin stellte sich im Jahr 1886 das Ziel „les homologues des lobes inférieurs“ (24) bei den Säugetieren zu suchen. Er beschrieb in einem kurzen Aufsätze (*Compt. rend.* 1889) als solche zwei kleine Ganglien die seitlich am Tuber cinereum liegen (ggl. lateralia?). Es wäre damit definitiv jene Anschauung der Autoren widerlegt nach der die L. inf. als etwas den Fischen durchaus eigentümliches betrachtet werden sollen. Doch bedarf die Arbeit von *Chatin* sehr der Bestätigung und Erweiterungen, indem z. B. vom Abgange der Fasern nur ganz unbestimmt die Rede ist, Es gibt an die L. inf. „soient composées de sub-

stance blanche et de substance grise“, (wie alle Gehirnteile), und dass er fusiforme und runde Zellen bemerkt habe.

Edinger fügte im Frühling 1892 seinen frühern trefflichen Arbeiten eine so weit es mit seinen Methoden möglich war, erschöpfende Darstellung des Zwischenhirns der (31) Selachier und Amphibien bei. Seine genaue Trennung der Faserbahnen hat mir gute Dienste geleistet und zum Vorbilde gedient. Zur speziellen Darstellung habe ich natürlich nichts zu bemerken, da mein Objekt ein anderes ist.

Während der Abfassung meines Manuscriptes erschienen von *Herrick* „additional notes on the Teleost brain“ zu früheren, im „Journal of Neurology“ erschienenen Arbeiten. Dieselben boten viel Neues zur Kenntniss unseres Gebiets. Wir werden Gelegenheit haben, das zu Erwähnende an den betreffenden Stellen anzuführen. (29.)



Morphologischer Teil.

Neben der enormen Ausdehnung des Mittelhirns ist einer der auffälligsten Momente im Teleostiergehirn das starke Uebergewicht, das die ventralen Teile des Zwischenhirns erlangt haben. Diese aufgedunsenen, caudal und ventral vom Thalamus opt. und von der Haube gelagerten Massen enthüllen uns folgenden complizierten Bau.¹⁾ Wir gehen bei unserer Betrachtung von der Plötze aus und zwar so, dass die durchaus allgemeinen Verhältnisse ebenfalls gleich am Beispiel geschildert werden.

1. *Leuciscus erythrophthalmus*.

Vom Tuber cinereum nehmen folgende Gebilde den Ursprung:

Medial ist die Hypophyse durch die feinen fast epitheldünnen Häute des Infundibulum mit ihm verbunden. Dieselbe steht bei den Teleostien in sehr geringem Connex mit dem Gehirn, sie repräsentiert sich klar als ein ursprünglich dem Centralnervensystem fremdes Gebilde. Sie liegt in einer Einsattelung des Basisphenoids in einer separaten Kammer der Schädelhöhle.

Lateral zu beiden Seiten vom dickwandigen Trichter entspringen als dessen symetrische Anhänge, und zugleich als Ausbauchungen des basalen Teils des Thalamus zwei mächtige Wülste. Sie umfassen den Trichter und füllen die zwischen diesem und der Haubenregion gelegene Spalte,

¹⁾ Die Ergebnisse dieses Abschnittes sind teils durch die Loupe, grösstenteils aber durch das Studium von Schnittserien erhalten,

(deren Fundus der Pars mamillaris entsprechen würde), grossen Theils aus. Diese behält zwar ihre Tiefe stets bei, da im Verlauf der embryologischen Entwicklung sich die Lappen immer mehr nach hinten wölben. Auch in ihren ventralen Parteeen sind sie meistens bis in die Mitte des Trichters mit diesem verwachsen. Eine sagittale Furche geht von hier aus und trennt durch ihren (medialen) Verlauf die beiden erwähnten Paare: Lobi laterales.

In der Furche liegt der Sacc. vascul.; sie verliert sich gegen der Haubenspalte, die von Pia und arachnoidalem Gewebe ausgefüllt ist, sowie von Blutgefässen, die durch eine starke Communication von der A. vertebralis ihre Versorgung erhalten. (Arteria basilaris.)

Die Form der Laterallappen¹⁾ sieht man am besten auf den Zeichnungen. Ich habe die Oberfläche, die stets graulich weiss erscheint, mit hellweiss durchschimmernden Streifen, oft höchst uneben, manchmal sogar durch seichte Furchen in Felder zerlegt gesehen.²⁾

Vorne sind die Lobi laterales getrennt durch jenes Dreieck (Trigonum fissum d. Autt.), das nur die etwas gewulsteten Ränder des Infundibulum bei abgerissener Hypophyse darstellt, und proral von den postoptischen Commissuren begrenzt wird.

Unmittelbar hinter dem Trichter nähern sie sich in verschiedenem Grade, sind aber immer durch caudale Recesse des Tuber, denen mehr oder weniger deutlich sich abhebende Lappen entsprechen, von einander getrennt. Diese Lappen, die ich als L. mediani bezeichne, sind innerlich paarig, äusserlich aber oft unpaarig angelegt und stehen durch eine Oeffnung mit dem Sacc. vasculosus in Verbindung. Dieser Recessus finde ich bis jetzt blos von *Herrick* genau

¹⁾ Sie werden hier so genannt, wurden aber von d. Autt. meist als L. inf. bezeichnet.

²⁾ Da dieselben keine Regelmässigkeit zeigten, glaubte ich nicht, ihnen Bedeutung beimessen zu dürfen. Eine andere Art von Furchenbildung vergl. bei der Beschreibung von No. 11.

und deutlich erwähnt. Er geht so weit, sie als mamillaria zu bezeichnen (vergl. pag. 429, No. 29). Zur Kritik dieser Deutung siehe den betreffenden Abschnitt.

(Nun stimmt allerdings die Beschreibung der kleinen Divertikel [rec. mediani] und ihrer Wände wohl überein mit meinen Beobachtungen, doch mündet der vasc. Sack augenscheinlich nicht in diese selbst, sondern in einen dritten unpaaren Recess, oder eine unpaare Oeffnung des Infundibulum.) Die Verhältnisse von Hypophyse, sacc. vasc. zwischen sich und den L. inf. sind aber so complizierte, und variieren bei den einzelnen Spezien so stark, dass diese Frage, die von *Ussow* (22) keineswegs erschöpft ist, durchaus einer besonderen Bearbeitung bedürfte. Man bedenke, dass es nur eines kleinen Plus oder Minus in der Ausbildung der meist so zarten dünnen Wände bedarf, um den Gefässsack mit der Hypophyse verschmelzen, oder aber in weit caudal gelegene Teile zurückweichen zu lassen. Der sacc. vasc. legt sich, wie oben bemerkt wurde, in die Medianfurche hinein und ist mit den umgebenden Teilen durch gefaltetes Piagewebe verbunden. Hiebei schmiegt er sich so enge in dieselhe hinein, dass oft der Eindruck hervorgerufen wird, er veranlasse durch mechanischen Druck die Einbuchtung und die Lappen liegen als Sattel auf ihm.

Schon durch macroscopische Präparation erweisen sich die L. inf. als Hohlgebilde. Sie sind je von einem Ventrikel durchzogen. Durch Reconstruction von Serienschnitten lassen sich dieselben nach Ursprung und Gestalt bis in die Détails hinein verfolgen. Sie stammen aus dem Infundibulartheile der dritten Ventrikel. Obgleich sie im Verhältniss zur Rindenentwicklung keine sehr grosse Ausdehnung aufweisen, so lassen sie doch eine ansehnliche Complication ihrer Anordnung erkennen und gewisse Eigentümlichkeiten derselben scheinen auf Unregelmässigkeit im Wachstum der L. inf. hinzudeuten. (Cornua.) (Taf. I, fig. 2.) Rec. med. und V. lat.

Feine Gänge verbinden die Ventrikel des L. lat. mit dem Infundibulum, das in diesen Gegenden verschiedene

Erweiterungen und Verengerungen aufweist (vergl. den Abschnitt über die Ganglienkerne.) Aus Fig. 2, 3, 9 von Taf. I, sowie dem Modell wird die Anordnung der Ventrikel klar. Sie ziehen sich in den L. laterales in zwei Cornua, ein anterius und posterius aus. Letzteres überwiegt an Ausdehnung und erstreckt sich bei manchen Typen fast bis an die caudale Wandung des zugehörigen Lappens (Stör.) Auch das scheint nur darauf hinzudeuten, dass das Wachstum in den caudalen Parteeen stärker zunahm als in den proralen, da diese durch die Schädelwandungen, durch den Nerv. II und die hinter dem Auge gelegenen Teile in seiner Ausdehnung beschränkt war. Vergleiche den allgemeinen Teil dieses Abschnittes (pag. 18). Begegnen uns doch auch an anderer Stelle Vorstülpungen der Ventrikel an der Stelle des stärksten Wachstumes (Vorderhirn der Säugetiere, caudaler Teil des Mittelhirns der Fische) auch aus der schlitzzartigen Gestalt der Ventrikel dürften sich Schlüsse ziehen lassen. — Die Verfolgung der embryologischen Entstehung aber zeigt uns klar die Richtigkeit der Annahme; die hinteren Hervorwölbungen gewinnen in der Tat erst nachträglich und rasch ihre Ausdehnung.

Die Ventrikel der medialen Lappen liegen ventral von denjenigen der Grösseren, vergl. fig. 2 und 3 der Taf. I. Diese Lappen sind zu klein, um macroscopisch wahrnehmbar zu sein, ausser bei einigen Specien und bei jungen Tieren.

2. Forelle.

Die L. inf. der Forelle sind mächtig entwickelt, besonders treten die Medianen Läppchen eine viel grössere Rolle an als diejenige, die wir sie bei *Leuciscus* spielen sahen. Entsprechend der starken Ausbildung verhält sich auch Erstreckung und Lumen der Recesses die an gleicher Stelle wie beim vorhin behandelten Typus abzweigen. Die mittleren Teile sind — damit wenigstens ein Anhaltspunkt gegeben sei — so stark ausgebildet, dass sie auf Trans-

versalschnitten an Stelle ihres stärksten Breitedurchmessers reichlich ein Drittel des gesammten L. inf. einnehmen.

Der Ductus infund. ist auch hier wieder nach vorne und unten gerichtet und zeigt Verschiedenheiten im Lumen, die auf ungleichmässige Verteilung des centralen Grau (Gangl. Kerne) hinweisen.

Die Faltungen, an denen die graue Substanz der Innern Lappen in die der Aeusseren übergeht, erinnert gänzlich an die Gehirnwindungen, die senkrecht zu ihrem Sulcus getroffen sind (z. B. im Cerebellum der Säuger).¹⁾

Die sich in Hörner ausziehenden Ventrikel der Seitenlappen lassen sich am besten zwei durch einen Querbalken H förmig verbundenen Bogen vergleichen, die ausserdem in doppelter Concavität: nämlich einer der Medianebene zugewendeten und einer nach unten sich öffnenden, aus der ebenen Fläche abweichen.

3. *Perca fluviatilis*.

Die L. inf.-Teile zeichnen sich hier durch eine volle, gewissermassen strotzende Entwicklung aus: nach hinten und unten wölben sich die Rindenteile, die hier sehr gut ausgebildet sind, weit vor und schliessen eine tiefe Furche zwischen sich; zwischen beiden Medianwänden der L. laterales füllt ein spongiöses Gewebe denselben aus.

Die Medianlappen sind nicht besonders gross, aber sehr distinct ausgebildet.

4. *Pleuronectes Platessa*.

Die L. lat. stark entwickelt, in dorsoventraler Richtung ausgebildet. Die Ventrikel etwas nach aussen convex gebogen. Ihre äussere Wand ist wiederum dicker als die Mediane, und die Enden der Bogen hakenförmig geschwungen.

¹⁾ An der Umbiegungsstelle ist die Rindenschicht etwas verdickt.

Die Communication mit dem Infund. kommt durch zwei kurze Anastomosen zu stande: dieselben verlaufen nach oben. Das Infund selbst ist sehr enge, verläuft nach hinten; Mittellappen sehr klein, unpaarig. Sie konnten leider nicht genau verfolgt werden, da der Zustand meines Exemplares die Herstellung zuverlässiger Serienschnitte nicht erlaubte. Der sacc. vasc. sehr weit nach hinten gerückt.

5. *Engraulis*.

Engraulis überrascht durch eine ausnehmend schöne und typische Ausbildung der uns interessirenden Teile. Dieselben treten hier in eine Sonderung und gegenseitige Unabhängigkeit, dass ich diesen Typus wählte, um an Handen von acht abgebildeten Schnittzeichnungen eine übersichtliche Darstellung des gröberen Baues (ohne histol. Détails) zu geben. Wohl bin ich mir der Nachteile bewusst, die die Abbildung von aufeinander folgenden Schnitten mit sich bringt, und der Ansprüche, die dies Verfahren an Geduld und Phantasie des Betrachters stellt, doch lässt sich in diesem Falle kein optischer Schnitt entwerfen.

Die Abbildungen erlauben mir, mich jeden weiteren Commentars zu enthalten.

6. *Gadus callarias*.

Absolut und relativ grosses Ueberhandnehmen der L. laterales; sie sind hier viel eher in die Tiefe ausgedehnt als in proro-caudaler Richtung. In dem tiefen Sinus-artigen Sulcus medianus liegt in Pialamellen aufgehängt der Sacc. vasc. und in seinem Grunde die in Gestalt zweier paariger Hervorwölbungen sich abhebenden Lobi mediani. Die Ventrikel derselben sind hier mit weitem Lumen ausgestattet, die Wände scheinen der Mächtigkeit und Struktur nach hoher physiol. Werth beanspruchen zu müssen.

7. *Anguilla vulgaris*.

Meine Sagittalschnittserien vom Aal zeigen deutlich die kräftige Ausbildung der L. i. Die Ausladung des Thalam opt. hat nicht sehr weit Platz gegriffen, sodass die Haubenspalte sehr tief, aber enge sich zwischen das Epichordal-Hirn und die L. inf. eindrängt. Grosse Ventrikel, besonders starke, hintere Hörner zeichnen das Gehirn des Aales aus.

8. Ein *Conger*-Gehirn

liess mich (leider bloss durch die Loupe, da der Zustand des Präparates keine Behandlung zu feineren Zwecken erlaubte) ähnliche Verhältnisse wie das Aalgehirn erkennen. Die Hypophyse wird zum enormen Hirnanhängsel, das das Cerebrum an Grösse übertrifft, der Sacc. vasc. dagegen ist schwächer entwickelt. Deutlich aber lässt die Hypophyse zwei gesonderte Partien erkennen, die einem functionellen Unterschied entsprechen dürften.

So wünschenswert mir auch gerade die Untersuchung dieses Gehirns wurde, so war durch den Zustand des Präparates minutiöse und unzweideutige Untersuchung unmöglich gemacht. — Bei

9. *Uranoscopus*

machte sich ganz wider Erwartung keine bemerkenswerte Abweichung bemerkbar. Bei diesem einzigen Vertreter der Bathybischen Fauna sind die L. inf. zwar klein ausgebildet, doch ohne einen Grad zu erreichen, der eine Schlussfolgerung erlaubte.

Es bedarf übrigens nicht der Erwähnung, dass überall, wo von Gross und Klein die Rede ist, stets das Mass im Verhältnis zum übrigen Gehirn gemeint ist. Dasselbe wurde übrigens auch mit Zirkel und Massstab gemessen und die Gleichungen daraus aufgestellt.

Von den vielen weitem Diagnosen, die ich von zahlreichen Specien sammelte, seien nur noch einige Wenige erwähnt, die Gehirne mit neuartigem Bauplane betreffen.

10. *Cyclopterus lumpus*.

Bei C. legten sich zwei Fortsätze der Sacc. vasc., der im übrigen zungenförmig oder in Gestalt eines Lamellibranchiatenfusses zwischen den Wölbungen liegt, um die Seiten des grauen Trichters herum bis in die Ebenen der Hypophyse, die hier an einem langen Infundibulum hängt.

Die Furchung, oder eigentlich besser das Höckerigwerden der Oberfläche, dessen ich schon bei *Leuciscus* Erwähnung tat, konnte noch bei mehreren Specien verfolgt werden. Am weitesten und am charakteristischsten führte diese Tendenz bei

11. *Holocentrum rubrum*.

Hier legen sich deutlich abgegliederte Teile des caudalen Endes des mittleren Randes von beiden Seiten gegen einander hin und treten in Contact: L. reflexi. Eine deutliche Furche trennt den Hauptteil des Lob. lateralis von diesem, der durch das Hinübertreten zu seinem congruenten Bruder zum Verbindungsstück wird. Ueber etwaige Differenzierung in der histol. Struktur war nichts zu ermitteln.

12. *Cyprinus Carpio*.

Auch im L. i. des Karpfens sind deutlich zwei zurückgebogene walzenartige Teile des Seitenlappens abgegliedert, die sich gegenseitig an einander legen und eine feste Verbindung zu Stande bringen. Im übrigen jedoch sind die L. i. nicht sehr voluminös.

Anmerkung: Die Substanzvermehrung am Fischgehirn durch die Mittel, die wir erst viel höher oben in der

Tierreihe zu finden gewohnt sind, nämlich durch Furchung, ist übrigens für Jeden, der eine Anzahl von Specien und besonders exotische zu untersuchen Gelegenheit hat, durchaus nichts neues. So fand sich gefaltet:

Das Vorderhirn bei *Sargus ovis*. *Herrick* teilte das Cerebrum einiger amerikanischer Arten nach diesen Lappen in Bezirke ein. (29).

Das Mittelhirn: *Gadus*, *Pleuronectes*, *Sargus*, Stör. Deutliche Einsenkung in der Fortsetzung der Richtung des Opticuseintrittes.

Hinterhirn. (Faltung in demselben Sinn wie beim Vogel). *Sargus ovis*, hieher auch der Hecht u. A. m. zu rechnen.

Das Material, das durch das Aquarium in meine Hände kam, setzte mich auch in den Stand, das Gehirn von *Acipenser* genau zu untersuchen. Der Stör zeigt ein wohl ausgebildetes, alle typischen Teile aufweisendes System von L. i. Es ergab sich dabei vorzügliche Gelegenheit, zum Studium der Arbeit von *Goronowitsch* (23) die nötige Anschauung zu gewinnen und die von diesem Autor aufgestellten Sätze zu prüfen.

Goronowitsch schildert die L. i. als zwei runde seitliche Vorsprünge des Lobus infundibuli, die eine breite Höhle einschliessen. Letztere geht in den membranösen Sack (vasculosus) über, pag. 434. Die Structur desselben wird auf pag. 549 geschildert.

Goronowitsch knüpft an die Verhältnisse des L. infundibuli phylogenetische Erwägungen wichtigster Art; dieselben reichen besonders in das Gebiet der Auffassung des Vorderhirns: sie sollen später besprochen werden.

Meine Beobachtungen lassen mich die Notiz von *Goronowitsch* von der starken Entwicklung des L. infundibuli pag. 434 bestätigen. Doch habe ich die Ventrikel bei meinem Präparate bedeutend enger gesehen, als dies die Figur 63 von *Goronowitsch* wiedergibt. Dabei hebe ich besonders hervor, dass kein künstliches Collabieren im Spiele

sein konnte; vielmehr war der Befund deutlich durch die besonders starke Ausbildung und Verdickung der Wände und ihrer Zellschichten verursacht. Die *Ventriculi laterales* bilden mehrere Aussackungen.

Das Paar der medianen Recesses ist gegenüber den mächtig entwickelten caudaleren Teilen recht gering, und lässt sich leicht als eine gewöhnliche hintere Erweiterung des Infundibulum auffassen; dieselben werden von *Goronowitsch* nirgends erwähnt; oder sollten sie unter „den drei oder vier distalen Lobuli der Hypophyse“ begriffen sein, die auf pag. 551 erwähnt werden? Dieselben sind jedoch sehr deutlich aus typischer nervöser Grundsubstanz gebaut.

Zur Grössenentwicklung der *Lobi inferiores*.

Um mir ein Urteil über die Mächtigkeit der Ausbildung der *L. i.* in Bezug zu anderen Gehirnteilen und zur Organisationshöhe des Auges zu bilden, habe ich möglichst genau Durchmesser und Tiefe einzelner Hirnorgane gemessen. Bis jetzt hat mich diese Untersuchung zu keinem prägnanten Resultat über diese Correlation geführt. Nur wenn Tabellen über sehr zahlreiche Arten vorliegen werden, ist zu hoffen, dass diese Statistik Gesetze abzuleiten erlauben wird. Es sei nur folgendes als Ergebnis eines Vergleichs der erhaltenen Zahlen anzuführen erlaubt.

1. Die *Lobi optici* stehen in einem viel engeren Verhältnis zur Ausbildung des N. opt. als die *L. i.* Bei Aal, bei Conger, wo das Mittelhirn sehr klein ist, deutlich bemerkbar.

2. Die *L. i.* stehen in einem indirecten Verhältnis zur Massenentwicklung des Vorderhirns. Bei Labrus, einem grossen Exemplar von Sargus, Serranus sind die *L. i.* mindestens so voluminös als das Vorderhirn.

3. Die *L. i.* stehen im Verhältnis zum Alter des Tieres. Je jünger nämlich der Fisch, um so grösser das Gehirn,

und innerhalb desselben sind wiederum die L. i. besonders hervorragend.¹⁾

Von vier Exemplaren *Sargus ovis* hatten die kleinsten die grössten Gehirne, sowie die grössten und best entwickelten L. i. nämlich:

		Breite der L. lat.	Länge der L. lat.
Sarg. ovis	91 mm	0,48 mm	0,40 mm
" "	92 "	0,44 "	0,36 ..
" "	95 "	0,45 "	0,40 ..
" "	103 "	0,43 "	0,32 ..

4. Zum Kleinhirn liess sich aus äusseren Gründen keine Beziehung auffinden. Das Letztere ist so unregelmässig, dass sich keine volumetrische Angabe machen liess. Der Faserverlauf aber lässt wohl eine Correlation erwarten.

5. In Bezug auf das Auge haben sich auch mehrere unerwartete Ergebnisse bei dieser Untersuchung herausgestellt, doch darf ich nur das folgende als sicheres Resultat anzudeuten wagen: Die L. inf. stehen in einem bestimmten, direct proportionalen Verhältnis zur Ausbildung des Auges, und zwar schon zur Grösse desselben und des Sehnerven. Dabei ergeben sich aber Aenderungen, die auf weitere Gesichtspunkte hinzudeuten scheinen, wie Unterschiede in der Lebensweise, in Temperament, Grösse, Alter, ferner je nach dem Genus; es gelang mir Vergleichungsreihen zusammen zu stellen, die das unzweifelhaft erkennen lassen.

Diese kurzen Sätze stellten sich auf Grund von etwa 30 durchgemessenen Fischepezies heraus. Wohl ist es mir klar, dass durch grob volumetrische Angaben sich nicht auf die Funktion, und nicht auf die Entwicklungshöhe von Hirnorganen schliessen lässt, in deren Auslegung wir uns ja stets nur mit vorsichtigem Tasten vorwärts bewegen

¹⁾ Wir sprechen nicht vom embryologischen Verhalten. Ueber dasselbe vergl. den embryologischen Teil.

dürfen, doch wird sich immerhin die Ausbildung derselben nicht nur in seiner histologischen Struktur, sondern auch in seiner Massentwicklung nachweisen lassen. Und dies um so mehr bei den niederen, histologisch weniger complizierten Typen.

Ueber die Methode der Messungen, und ihre Berechtigung habe ich vielleicht Gelegenheit, mich an anderer Stelle auszusprechen.

Ueber die Variation in Grösse und Form der L. inf. bei den verschiedenen Arten kann allerdings eine Reihe nach der Progression der Ausbildung aufgestellt werden; dieselbe würde aber, soweit meine Einsicht reicht, keine allgemeinen Schlüsse in Bezug auf Verwandtschaftsgrad ziehen lassen. Dass aber eine Verschiedenheit der physiologischen Ausbildung der Erwähnten parallel geht, ist zwar wahrscheinlich, in ihrem näheren Sinne aber nur vollständig unklar. Es sei dagegen hier schon vorausgenommen, dass auch die Betrachtung der histologischen Struktur in die oben erwähnte Reihe — Forelle, Barsch, Anchovis, Cyclopterus — keine Aenderung bringt.

Bei der Betrachtung des Zwischenhirns der Fische können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass wir hier in den Gang des mechanischen Ereignisses hinein blicken, dessen sich die Natur zu ihrem Zwecke der Entwicklung bedient hat: Die L. inf. scheinen durch das Ueberhandnehmen des Mittelhirns und das Ueberschieben derselben gegen das Grosshirn in die Tiefe gedrückt worden zu sein, und im Laufe der ontogenetischen Entwicklung immer mehr dorthin zu rücken. (cfr. 27).

Dafür spricht die ganze Anordnung des Zwischenhirns mit seiner keilartigen Form, die sich in dem Ggl. habenulae gipfelt und im freien Raume der Brückenbeuge fassen würde. Ausserdem die Entwicklung im Verlaufe der Ontogenie. Vielleicht auch die Enge des dritten Ventrikels, die Form der Ventr. latt. und die Erweiterung des Ventr. inf.

Histologischer Teil.

Die Elemente, aus denen sich die L. inf. zusammensetzen, sind wie bei allen andern Gehirnteilen dreierlei Art:

1. Einzelne nervöse Zellen mit Fortsätzen.
2. Ganglienkerne.
3. Bindegewebsselemente.

Hiernach richtet sich auch unsere Gliederung.

Bei weitem der grössere Teil der Textur wird von der Bindegewebssubstanz (Stütz- und Grundmasse) gebildet; die nervösen Zellen sind in derselben an bestimmte Stellen localisiert, finden sich aber daneben noch überall zerstreut wie dies bei den niederen Hirntypen meistens der Fall ist. Die Unterscheidung der Stützzellenkerne und der kleineren Ganglienzellen ist oft sehr schwierig, manchmal kann uns nur der Nachweis des Axencylinderfadens mit der Silbermethode Aufschluss geben. Derselben Schwierigkeit begegnen wir in noch höherem Grad bei der Untersuchung am Rückenmark von *Petromyzon*. (*David*, Journal of comp. Neurology. Vol. II. pag. 92.)

I. Ganglienzellen.

Bei Betrachtung von gefärbten oder mit Silber imprägnierten Schnitten durch das Gesamtgebiet der Lobi inferiores unterscheiden wir folgende Zellregionen:

1. Ein um die Ventrikel gelagertes centr. Grau.

Angaben früherer Autoren über diese Formation sind nicht hervorzuheben. Dieselbe ist ein Gebilde sehr regelmässigen Vorkommens. Auf den Zeichnungen von *Frütsch*

und *Mayser* (13, 14) ist dieselbe angedeutet. *Chatin* (pag. 629, 24) erwähnt „des cellules fusiformes“. Nach *Edinger* (31) liegt im Mittelstück des L. infundibuli der Selachier nach innen ein ziemlich lockeres und an Zellen reiches Gewebe. „Die markhaltigen Nervenfasern entspringen offenbar aus diesen Zellen, denn man sieht ihre feinen Reiserchen oft genug bis dicht an die Zellen herantreten. Es wird aber anderer mit besseren Methoden ausgeführter Untersuchung bedürfen, um über das Histologische Klarheit zu schaffen.“ — Nach *Goronowitsch* (p. 550, 23) sind „in der faserigen Schicht des L. infund. des Störes rundliche Zellen spärlich zerstreut, sowie eigentümlich stäbchenförmige Kerne“. Ferner „rundliche Körnerzellen in mehreren Reihen, deren radiale Fasern oft weit zu verfolgen sind.“ Vom Faserabgang wird nichts erwähnt.

Diese Formation finde ich besonders schön ausgebildet bei *Perca fluviatilis*. Sie nimmt die vorderen Wände des Trichters ein und erstreckt sich nach den Seiten und nach unten bis vor die mittleren Lappen, deren proraler Teil ebenfalls sehr zellenreich ist. Sie verliert in den lateralen und caudalen Partien des Trichters an Mächtigkeit und fehlt beim *Leuciscus* (fig. 1, Taf. I) fast vollständig um die ventriculi loborum herum, die aber von einem mehrschichtigen dichtgedrängten Epithel ausgekleidet sind. Die Figur zeigt, dass das centrale Grau am proralen Rande des Trichters bis an die Peripherie reicht und in die Rinde übergeht. Ausserdem ist auch der in den sac. führende Lappen noch nervös und mit Zellen ausgestattet. (Taf. I, 1 und a).

Auch bei der Forelle, bei *Engraulis*, und *Gasterostens* ist das centrale Grau stark ausgebildet, schwächer beim Weissfisch.

Aus den eben besprochenen Zellenschichten sammeln sich caudal und lateral vom Trichter dichtere Schwärme an (Ganglienkerne). Dieselben zeigen jedoch keine Constanz in ihrem Vorkommen, variieren nach Zahl und Lage,

und erlangen nie eine besondere histologische Struktur. Ihre Sonderung besteht wesentlich nur in einer dichteren Häufung der Elemente. Jedenfalls ist es unmöglich, dieselben mit Kernen höherer Tiere zu homologisieren, obwohl uns Vergleiche mit den Ganglia tubercis, medialis und lateralis des Mamillarrhöckers nahe gelegt sind.

Ueber das Austreten der Fortsätze dieser Zellen geben uns gewöhnliche Färbepreparate gar keinen Aufschluss; wir haben zur Erreichung unseres Zweckes zu Silber- und Weigert-Präparaten zu greifen: Die Imprägnation zeigt uns die drei- und vierpolige Gestalt der Zellen; die nervösen und die Protoplasmafortsätze gehen unregelmässig und in mannigfachen Richtungen ab. (Taf. I, fig. 6.) Der schwer aufzufindende Axencylinder war immer nur auf ganz kurze Strecke zu verfolgen und dann wie abgeschnitten.

Die Golgi-Methode setzt uns also in den Stand, den Befund *Edingers* über das Selachierhirn auch für dasjenige der Knochenfische zu bestätigen, und demselben beizufügen die Angabe vom Verlauf des Axencylinders. Die von *Goronowitsch* gemachte Beobachtung über spärliche runde Zellen wird bestätigt; die von demselben Autor und von *Chatin* erwähnten stäbchenförmigen Zellen jedoch als Epithelzellen mit radialem Fortsatz erkannt. (Vgl. pag. 20.)

Folgende Fibrillenbündel treten mit dem centralen Grau in Verbindung.

a) Commissura cinerea.

Die von *Edinger* im Zwischenhirn der Haie erwähnte graue Commissur ist beim Knochenfisch schwach vorhanden. Ich konnte sie bei mehreren Arten überhaupt nicht wahrnehmen. Sicher ist sie nicht markhaltig.

b) Hinteres Längsbündel.

Bei Cyclopterus kommen aus der hinteren Längsbündelformation einige feine Fasern in Zellen des dorsalen Hohlengrau. Sie liegen ziemlich median, innerhalb vom Vorder-

hirnbündel und Fasciculus retroflexus. Das centrale Grau des Cyclopterus besteht übrigens aus wenigen aber ziemlich grossen Zellen. (Vergl. die Figuren, die die Faserbündel darstellen! Taf. II, fig. 1.)

c) Vorderhirnbündel.

Die Verbindung mit dem Stammganglion des Vorderhirns ist die wichtigste des ganzen L. inf. In der Tat scheint letztere in mehr als einer Beziehung die Stelle des sogenannten Cerebrum zu vertreten.

Die Fasern dieses Doppelzuges ziehen zu beiden Seiten des Tuber cinereum aus den Pedunculis herunter. Immerhin ist es deren nur eine geringe Zahl; über das Schicksal des Restes des Vorderhirnbündels vergleiche das Kapitel über den Faserverlauf. (Pag. 40.)

2. Zwischenzellen.

Wir haben schon an anderer Stelle jener zerstreuten Zellen Erwähnung gethan, die hin und wieder und gar nicht immer selten in der Medullarsubstanz zwischen den Ventrikelepithelien und der Rinde verteilt sind. Ihre Fortsätze schliessen sich den aus den benachbarten Zellschwärmen entstandenen Zügen an und gelangen mit diesen an ihre Bestimmungsorte. Wir befinden uns schon in jenem prächordalen Gebiete des Gehirns, in dem keine der grossen Ganglienzellen vorkommen, deren Phylogenie zusammen mit derjenigen der Nervenwurzeln so interessant, aber auch so schwierig zu verfolgen ist. (9.) Umsomehr musste es daher verwundern, als ich oberhalb des Nucleus rotundus bei *Perca fluviatilis* mehrere grosse Ganglienzellen zu Gesichte bekam; leider war der Verlauf des Axenfadens nicht darzustellen, da sie aller Imprägnationsversuche spotteten. Daher muss ich die Frage offen lassen, ob sie nur besonders gross geratene Zwischenzellen, oder losgelöste des benachbarten runden Kerns darstellen, und mich darauf beschränken, sie

erwähnt und gezeichnet zu haben (Gr. Zellen); allerdings liesse sich ihr Vorkommen an besagter Stelle für die theoretische Auffassung der L. inf. verwerten.

Diese Zellen entsprechen aber nicht genau dem hinteren Kern, in welchem nach *Fritsch* (13) und *Mayser* (pag. 287 und 288. 14) die hinteren Längsbündel enden sollen. Dieser „Linsenkern“ (*Fritsch*) liegt weiter lateral und dorsal als dieser. (Vergl. 13. Taf. VI, fig. 36.)

3. Cortex.

Von früheren Angaben über die Rinde ist folgendes zu erwähnen. Auf *Mayers* Zeichnungen ist dann und wann ein Unterschied zwischen der innern und äussern Schicht der L. inf. angegeben, obwohl im Allgemeinen dieses Gebiet von unserm Autor leer gelassen wurde. *Chatin* sieht in den äussern Schichten multipolare Zellformen (pag. 629, 24). Bei *Acipenser* wird von *Goronowitsch* eigentümlicherweise nichts erwähnt, dagegen gibt *Herrick* (29) genaue Angaben über Trennung in eine medullare Substanz und eine Rindenschicht in der während der Abfassung meiner Artikel erschienenen Nummer des „Journal of Neurology“. Ferner gibt *Burckhardt* im L. inf. von *Ichthyophis* „grosse Ganglienzellen“ an (pag. 376, 30).

Die Rinde ist der auffallendste und bedeutsamste Teil des nervösen Gewebes im untern Zwischenhirn. Das L. i. Gebiet erlangt dadurch für uns eine physiologische und phyletische Bedeutung, die um so höher erscheint, wenn wir die Menge nervöser Faserbahnen erblicken, die in dasselbe hinein münden. Auch von diesem, dem histologischen Gesichtspunkte aus steht das untere Zwischenhirn der Knochenfische und Ganoiden weit über dem entsprechenden Gehirnteil der Haie. In letzterem mögen ja die Anlagen zur hohen Ausbildung dieser Elemente schlummern, doch haben wir in dieser intensiven Differenzierung eine ganz neue Entwicklungsrichtung zu erblicken (wie dies schon *Goro-*

nowitsch (23) in Bezug auf die anatomischen Verhältnisse erläuterte). Die Anordnung der Rinde ist am stärksten auf einer äquatorialen Zone, die auf den Seitenwänden vom Trichter bis zur hinteren Einkerbung reicht. In den caudalsten Teilen der L. laterales charakterisiert sich die Verteilung durch dicht gedrängte Anhäufung von Zellen, die hauptsächlich in paraperipheren Schichten entwickelt sind, sich aber auch gegen die Ventrikel hin vordrängen. Diese Parteen liegen hinter jener Substantia nigra, deren massenhafte Fasern sich bei Hämatoxylin-Behandlung dunkel färben. Ihre (der Sub. nigra) Fasern entspringen teils diesen Zellen, teils aber gehören sie auch dem Markstiele des Nucleus rotundus an.

Das Auftreten der Zellen ist kein sehr regelmässiges und ihre Anordnung nicht die streng zonenförmige wie etwa im Tectum opticum der Fische, dem Cerebellum der Säuger etc.

Soviel ich bis jetzt übersehe, ist vor allem bei *Gyclopterus* die Markpartie von der corticalen sehr deutlich getrennt. Die Grundsubstanz nimmt hier in den beiden Teilen eine ganz verschiedene Ausbildung an. Sie lässt daher schon auf den ersten Blick den L. i. in zwei Abteilungen zerfallen. Sogar ein *Weigert*-Präparat lässt den Unterschied zwischen der grossblasigen maschigen Rindenzone erkennen, die wie ein Mantel den stielartigen Pedunculus umgiebt. Dasselbe bei *Gadus*. Die Abtrennung der beiden Teile ist keine scharfe; Blutgefässe und Gliazüge vermitteln den Uebergang; am Trichter vorne geht die Rinde in das Centralgrau über. (Taf. I, Fig. 1, 2, 3).

Zellen der Rinde. Zur Darstellung der Ausläufer der Zellen bewährt sich nun hier die modifizierte *Golgi*-Methode vortrefflich; durch sie erhalten plötzlich diese Körper für uns einen bestimmten Sinn und zugleich eine prinzipielle Bedeutung. Ihre Protoplasmafortsätze gehen nämlich seitlich und nach innen ab, verzweigen sich in

geraden und sanft gebogenen nicht in sehr gewellten und geschlängelten Linien (Fig. 4 und 6, Taf. I).

Auf eine genauere Beschreibung der Rindenzellen verzichte ich und verweise auf die Abbildungen, in denen ich mich bemühte, einige der typischen Formen und Ramificationen minutiösgenau wieder zu geben.¹⁾

Dieses Verhalten, dass sich nämlich die Protoplasmafortsätze nach dem Centrum zukehren, scheint hier bei niederen Wirbeltieren zum ersten Mal beobachtet zu sein. Wohl hat *Oyarzun* (21) vor 4 Jahren am Froschgehirn die *Golgi*-Methode geprüft und *Fusari* und *Tartuferi* am Tectum opticum der Knochenfische (19). Ersterer zeigte „multipolare“, mit nach aussen und tangentialwärts gerichteten zahlreichen Protoplasmafortsätzen versehene Zellen, deren Axencylinder oft caudal zu verfolgen war. Betreff des Tect. opt. vergl. das Litteraturverzeichnis. Ich habe selbst die *Fusarischen* Resultate vollständig bestätigen können. Zellen vom eben erwähnten Typus aber fehlten vollständig. Die nervösen Fortsätze gehen teilweise zwischen und mit den Protoplasmafasern ab, teils aber treten sie zuerst peripheriewärts aus, wenden dann um und laufen im Bogen an ihrer Zelle vorbei und in die weisse Substanz zur Vereinigung mit den andern Fasern. Wir verstehen dieses Verhältnis leicht aus der Betrachtung der Histogenese:

Wir wissen durch *His*, dass sich der Axencylinder der Zellen ziemlich frühe auszieht, in einem Stadium, das sich nicht viel von jenem indifferenten Keimzellenstadium unterscheidet (25, 26). Ferner ist einer der bedeutsamen Punkte, auf die *His* l. c. aufmerksam macht, „die ursprünglich ein-

¹⁾ Ich glaube weder, dass die sich darbietenden Formen unbedingt die natürlichen vorstellen, noch bin ich im Stande, präzis die eingetretenen Veränderungen zu ergründen; so bleibe es Jedem selbst überlassen, sich aus der Combination der durch verschiedene technische Behandlung erhaltenen Resultate sein Urtheil über die betreffenden Gebilde zusammenzusetzen.

seitige Entwicklung aller Nervelemente.“ Auch der Axenfaden der älteren Rindenzellen des L. i., die sich aus dem Epitheliallager ableiteten, (vergl. embryol. Teil) wird sich also zuerst in radiärer, centrifugaler Richtung gebildet und erst später, im Verlauf der weiteren Entwicklung und der Lageveränderung seines Zellkörpers umgebogen haben. Ja wir können uns vielleicht die von ihm durchlaufene Bewegung als die mechanisch natürliche und notwendige Folge des Hinausgedrängtwerdens der Rindenzelle vom epithelialen Lager weg vorstellen.

Dafür spricht: 1. Der embryologische Befund des radiären Fortsatzes. 2. Das ebendortige Fehlen eines umgebogenen Axenfadens. 3. Nur die grösseren Zellen zeigen dieses Verhältnis. Wir wissen aber, dass dies auch die ältesten sind.

Viele Fasern durchziehen parallel der Peripherie die Rindenschicht und stellen die Associationsverbindung zwischen den Zellen her.

Es ist an dieser Stelle besonders hervorzuheben, dass im Vorderhirn der Knochenfische eine Rinde durchaus nicht nachzuweisen ist. (23, pag. 563). Die Ausbildung dieses Gewebeteils im Zwischenhirn ist daher besonders bedeutsam.

II. Ganglienkerne.

Wie in so manchen andern zu grösserer Bedeutung gelangenden Teilen des Centralnervensystems treten auch in unserm Gebiet nervöse Zellen, manchmal solche von verschiedenem Typus, zur Bildung von verschiedenen Kernen zusammen. Natürlich haben wir bei der Wahrnehmung solcher Ansammlungen sofort an prägnante physiologischer Differenzierung zu denken. Ausserdem gewinnen solche Localisationen für uns eine grosse Wichtigkeit zur Erkennung von Homologien.

Der hauptsächlichste und wichtigste Kern unseres Gebietes, der Nucleus rotundus ist schon *Fritsch* (13) und

Sanders (10) bekannt. *Mayser* (14) beschreibt ihn mit eingehenden Fasern. *Goronowitsch* (23 pag. 550) erwähnt zwei Ganglienpaare in den Wänden des Infundibulum. Endlich gelingt es *Herrick* (29, Juni 1892) die Kenntnis vom Nucleus rotundus weiter zu fördern. Seine Beobachtungen können bestätigt werden. Betreffs der Deutung werde ich im Verlaufe der Aufzählung meines Thatsachenmaterials noch auf die Auffassung dieses Autors zu sprechen kommen.

Die Ganglienansammlungen unseres Gebietes sind histologisch zweierlei Art. Erstens solche, die durch gedrängte Anhäufung von kleineren Zellen ohne weiteres zu Stande kommen. Sodann finden sich in unserm Gehirnteil deutliche Zellkerne, die durch Zusammentreten von Zellen besonderer Form und verschiedener Typen, zugleich mit Marksubstanz charakterisiert sind, und eine typische Struktur aufweisen.

a) *a.* Unter ersterem sind mehrere in den Wänden des grossen Trichters wahrzunehmen. Sie treten schwarmartig aus den Zellen des centralen Grau hervor und verursachen öfters Veränderungen des Lumen des Ventrikels.

Sie bieten aber zu wenig Konstanz in ihrem Vorkommen und Verhalten, als dass es sich irgendwie lohnte, ihren Abänderungen speziell nachzugehen. Es kann keine Rede davon sein, dass ihnen dieselbe vergleichende anatomische Wichtigkeit beizulegen wäre, wie jenen, im Mamillarteile des Säugetiergehirns sich findenden Kernen. (pag. 37 u. 38).

β. Eine starke Zellenansammlung dieses Typus aber scheint mir regelmässig vorhanden zu sein. Ich konnte sie wenigstens auf allen besseren Färbepreparaten beweisen; besonders schon bei *Perca*, *Engraulis*, *Leuciscus*. Sie liegt direct über den medialen Lappen, die oben betrachtet wurden. Sie nimmt die hintere Wand des Tuber ein und besteht einmal aus einer dichten peripheren Lage von Zellen (caudal gelegen), sodann reihen- und schwarmweise gegen das Tuber zu vordringenden Kernanhäufungen.¹⁾

¹⁾ 29. *nidulus subthalamicus*?

Bei *Engraulis* stellt sich derselbe Kern auf Schnitten derselben Orientierung etwas breiter dar und nicht in der rundlichen Form, die wir demselben Barsch annehmen sahen. Es umfasst einen Teil der Hinterwand des Tuber cinereum.

b) Dem zweiten der oben erwähnten Kerntypen gehört der von *Fritsch* beschriebene und benannte Nucleus rotundus zu. Die Beschreibung war damals mangelhaft genug dargestellt, „es ist begreiflich, dass man sich nur schwer eine Vorstellung davon bilden kann, auf welche Weise die betreffenden Organe zusammengesetzt sein mögen.“

Eine starke Hülle von Markfasern umzieht den runden Kern. Dieselbe stammt:

1. Aus einem „Markstiel“, der in den caudalen Rindenschichten u. a. O. m. entspringt (Taf. I, 1. II, 2, 3).
2. Aus Fasern der Zellen des Kernes selbst.
3. Hinteren Längsbündelfasern?
4. Ganz wenigen Opticusfasern?

Herrick unterschied zweierlei Zellen, grosse und kleine; Fasern durchziehen sie und treten oft von zwei Seiten zugleich an sie heran. Ich bin im Stande noch einige typische Formen abzubilden. Stärkere Systeme und Homogene Immersionen enthüllen das Fasergewirre, aus dem leider nur Détails, keine Uebersicht abgeleitet werden konnte, die etwa die Aufstellung eines Schemas ermöglicht hätte.

Nicht nur in Betreff der histologischen Struktur und Deutung, auch sonst bietet der kurz als Nucleus rotundus bezeichnete Kern noch viel unaufgeklärtes. *Mayser* beschreibt ihn auf pag. 289 (14) und legt ihn bei Cyprinoiden richtig zwischen vordere und hintere Wurzel des Sehnerven (l. c. vgl. die Fig.). Beim Hecht „nimmt er die Form einer langgestreckten Walze an.“ Von *Herrick* dagegen (anat. Anz. VII pag. 429) wird er in den Ped. lobi lateralis versetzt und gezeichnet, während wir bei *Mayser*

merkwürdigerweise vergebens die Angabe dieses Verhältnisses aufsuchen.¹⁾

Wir haben es hier offenbar mit den zwei verschiedenen Fällen verschiedener Arten zu thun und zwar:

Bei Cyprinoiden liegt ein drehrunder Kern (mit einem kleinen ventraler gelegenen Nebenkern) zwischen den Opticuswurzeln. Ein Zug verbindet ihn mit einer Zellansammlung die im Pedunculus lobi lateralis, vor dem Gangl. interpedunculare, ventral vom Bindearm, dorsal vom Rec. lateralis liegt. Der Tractus ist doppelt. Die hintere Zellansammlung enthält wohl grössere Zellen, jedoch keine Markhülle, und ist vom Tract. ad. comm. horiz. durchzogen, resp. umfasst.

Beim Barsch umzieht eine starke Markhülle den runden Kern; seine Lage und Struktur ist die der Fig. 1, Taf. I N. r. zu Grunde liegende. Nach vorne und oben zieht er sich länglich aus und schliesst mit einer Endanschwellung ab. Die Zellen beider Teile stehen in Faser-Verbindung. Das Ganze hat allerdings eine Walzenform. Ich kann mich nicht der Ansicht verschliessen, dass in unserm zweiten Falle aus den beiden, bei Cyprinoiden getrennten Kernen, die jedoch auch dort durch ihre Faser-Verbindung zusammenhängen, ein einziger hervorzugehen beginnt (oder umgekehrt). Hand in Hand mit der Umbildung geht eine grössere Complication der histologischen Struktur, besonders des caudaleren Teils.

Folgende Thatfachen sind geeignet bei dieser Auffassung mitzusprechen:

1. Die Struktur des Cyprinoiden-„Nucleus rot.“ bietet grosse Aehnlichkeit mit dem des Barsches.

2. Fasern des Opticus durchsetzen den Nucl. rot. der Cyprinoiden nach eignen und *Mayser's* Beobachtungen (14

¹⁾ Wie ein genaues Studium von pag. 287—288 (14) ergibt, können wir denselben nicht etwa in den Nuclei cordicales oder lentiformes suchen. — Der Nucleus rotundus nimmt bei *Mayser* teil am corp. geniculatum, s. lat.

pag. 341). Ebenso tritt ein Opticusbündel in jenen weiter hinten gelegenen Nucl. rot. unsres zweiten Falles (s. Beschreibung des Opticusbündel).¹⁾

3. Aehnliche Unbeständigkeiten in Ganglien (*Mayser* pag. 289) lassen dieses Verhalten nicht allzu unerwartet erscheinen.

4. Bei *Cyclopterus* ist die Verschiebung noch weiter fortgeschritten. Fast kommt uns der Barsch als Uebergangsstadium vor.

In der jüngst erschienenen Arbeit *Herrick's*, die wir schon einige Mal zu erwähnen hatten, wird der Nucleus rotundus als der rote Kern der Säugetier-Haube gedeutet. Meine vergleichenden anatomischen Kenntnisse erlauben mir einstweilen noch nicht, ein Urtheil über diese Homologisirung zu fällen. Nur darf einstweilen darauf hingewiesen werden, dass wir auch an analoge Organe denken dürften.

Dagegen bin ich im Stande, der *Herrick'schen* Beschreibung noch die Thatsache beizufügen, dass sich im embryonalen Gehirn der runde Kern höher oben anlegt, und noch bei der Forelle 27 mm. so weit in dorsalen Teilen oben liegt, dass allerdings die Herkunft aus der Haube zur Stütze der aufgeführten Ansicht benutzt werden könnte.

Die Blutgefässe des runden Kerns stammen sowohl aus dem grossen Stamm der in der Sattelspalte daherzieht, und stehen auch mit dem im Ventrikel lob. lat. liegendem Gefäss in Verbindung. —

Bei der Betrachtung des N. r. fallen uns vor allem zwei Momente in die Augen: 1. Die enorme Intensität der Ausbildung im Innern des Kerns, die sich in der Vielseitigkeit der Faserverbindung der Zellen und in der reichen Drainirung mit Gefässen ausspricht, und zweitens die Isolation durch den Fasermantel und allgemeine Abrundung nach aussen. — Wenn wir zugleich den Reichtum der zugehörigen

¹⁾ Für die Annahme einer Verbindung fehlen jedoch „die stricten Beweise“ so gut wie zu *Mayers* Zeiten! (pag. 341. 14.)

Faserverbindungen in Betracht ziehen, so glaube ich nicht, dass es zu weit gegangen ist, wenn wir diesen Kern als ein associationenreiches Centrum auffassen, in dem ein lebhafter Umtausch und Umsatz von Reizen stattfindet, während dasselbe als Ganzes eine relative Selbständigkeit inmitten derjenigen Neuronsysteme einnimmt, die wir als die directen Projectionen (im Sinne *Meynerts*) anzusehen gezwungen sind.

Diese Selbständigkeit gewinnt an Bedeutung, wenn wir bedenken, dass einesteils es sich nicht um ein spezifisches Nervencentrum handelt, sondern offenbar um eine viel allgemeinere Funktion und ferner, dass so verschiedene Gebiete des Centralnervensystems in diesem Brennpunkte ihre Strahlen convergieren lassen. Nämlich: Opticus (Vorderhirn), Thalamus opticus (Kleinhirn), Lobus lateralis, Sacc. vasc. Hintere Längsbündel.

III. Gliagewebe. (a Epithelien.)

Von Angaben früherer Autoren erwähne ich: *Chatins* „cellules fusiformes“, *Goronowitsch* „doppeltes System von Gliafasern“ (pag. 549, 32), *Edingers* Stützzellen im Selachiergehirn (31).

Die Anordnung der Glia folgt der für die meisten Gehirne geltenden Norm und zeichnet sich nur in einigen ihrer Teile durch besondere Feinheit aus. Gut fixierte und mit Eosin oder bleu de Lyon nachgefärbte Präparate zeigen bei schwächeren Vergrößerungen eine fast homogene Grundsubstanz. Schreiten wir zu stärkeren Systemen bis zu Immersionen vor, so löst sich dieselbe in ein festes Maschenwerk auf, dessen Stäbe und Fasern von den Protoplasma-körpern kleiner Bindegewebzellkerne ausgehen. Anastomosen, Verschmelzungen und Kreuzungen sind häufig. In den genannten Präparaten liegen die Nervenzellen in den Maschen an die Wände geschmiegt und lassen ihre Fortsätze zwischen den glösen Strängen verschwinden. Starke

Bindegewebsfasern treten zu Balken zusammen und durchziehen in radialer Richtung hauptsächlich den Lob. lat.

Reich verzweigte Blutgefässbäumchen durchziehen den Lobus inferior nach allen Richtungen, doch halten auch sie meistens radiale Richtung ein. Sie zeichnen besonders das Gehirn der Forelle und des Aales aus (vergl. auch die Grösse und Bedeutung der Hypophysis und des Sacc. vasc.). Bei Cyclopterus ist die Grundsubstanz sehr distinkt in zwei Abteilungen verschiedener Struktur geschieden.

Eine eigentümliche Configuration des Gliagewebes fand ich in jener Pars commissuralis, die durch *Edinger* von der Pars infundibularis, der eigentlichen Loben-Region unterschieden wurde. Ventral von den Fibrillen der Commissuren wird durch lange und äusserst feine Stützgewebefasern ein enggeflechtes Netzwerk von grosser Zartheit gebildet (Taf. I, Fig. 7). An den Kreuzungspunkten der Fäserchen fehlt eine Verdickung vollständig, ebenso die Andeutung irgendwelcher Verschmelzung; ich glaube kaum, die feinen Anschwellungen als Kerne ansehen zu dürfen; dieselben können auch durch die Versilberung hervorgerufen sein. Ich bin genötigt, diese eigene Art von Textur ohne weiteren Kommentar hinzustellen.

Das Epithel der Ventrikel ist mehrschichtig; die Zellen desselben sind mit feinen Fortsätzen versehen (s. Fig. 5 u. 5a, Taf. I). Parallel der Oberfläche des Epithels ziehen ebenfalls feine Fasern. Wir stehen hier vor einem der frappantesten Beispiele für die durch die Silbernitratbehandlung verursachten Deformationen: Die bei Färbung und Zupfung sich ganz deutlich rund darstellenden Zellkerne werden im Verlaufe der erwähnten Behandlung offenbar contrahiert. Wir werden dadurch erinnert, wie gut wir thun, auch die übrigen Versilberungsformen nur mit einem gewissen Vorbehalt als thatsächlich vorhanden anzunehmen. Um so mehr, da uns für die Kortexzellen z. B. keine andere Technik zu Gebote steht.

IV. Faserverlauf.

Wenn ich die Faserbahnen einer besonderen Betrachtung widme, geschieht es aus folgenden Gründen:

Wir treten hiemit an den schwierigsten Teil der Untersuchung heran, der insofern ein verschiedener ist, als wir erst durch die Erkenntnis des Verlaufes der Tractus im stande sind, in den eigentlichen Sinn und die Bedeutung der bis dahin abgehandelten Elemente einzudringen. Dann sind wir genötigt, zur Darlegung dieses Problems nicht nur zu andern Techniken zu greifen, sondern auch andere Untersuchungswege einzuschlagen.

Es gelingt uns aus dem manchmal unentwirrbar, jedenfalls aber höchst kompliziert erscheinenden Gewebe folgende zehn Züge darzulegen.

Hintere Längsbündelformation.

Ich folge mit diesem Ausdrucke *Honegger*, der denselben zur Unterscheidung vom hinteren Längsbündel im engeren Sinne der Autoren gebraucht.

Die Hauptmasse des hinteren Längsbündel (Fig. 1, Taf. I H L B) verläuft in den Thalamus opticus. Dagegen ziehen zwei kompakte Bündel in schönen Bogen über das Ganglion interpedunculare dahin, innerhalb der *Meynert'schen* Bündel M B. Diese Kreuzungen dürften an den Stellen liegen, wo wir bei den Gehirnen höherer Tiere den Eintritt des *Vicq d'Azyr'schen* und *Gudden'schen* Stranges zu suchen hätten. Dass wir aber vergebens irgend welche Züge mit den beiden genannten zu homologisieren versuchen werden, wird für Jeden von selbst verständlich, der die unregelmässig pinselförmig zerfahrenden und in alle Partien des Lobus eindringenden Fasern auf sagittalen Schnitten zu verfolgen strebt. Auch die Anhaltspunkte, die uns die Endigungsweise geben würde, fallen aus auseinandergesetzten Gründen dahin.

Bei Barsch, *Cyclopterus* und Plötze kann ein Bündelchen der H L B F an und in die Markhülle des runden Kerns hinein verfolgt werden. Dadurch wäre für die Auffassung *Herricks* vom Nucleus rotundus als roter Kern (29) vielleicht eine weitere Stütze erbracht. Es treten in der That im Gehirn des Menschen Fasern, die sich vom hinteren Längsbündel lösen, in den Nucleus ruber.

Bindearme.

Nicht nur vom Pedunculus cerebelli, sondern auch von der Valvula her ziehen Bündel zu den hinter dem runden Kern und vor den Interpeduncularganglien gelegenen Partien zur Durchflechtung mit den hinteren Längsbahnen (Fig. 1 und 2, Taf. II B A & T R v.)

Tractus horizontalis.

Ursprung. Zu beiden Seiten der Commissura super. und post. im vordern Teil des Mittelhirndaches. Wir sind der Ansicht, dass keine seiner Fasern in die obere Kreuzung übergeht (s. Fig. 1, 2 und 3, Taf. II Tr. horiz.). Wir erblicken auf guten *Weigert*-Präparaten deutlich eine Anzahl grosser polygonaler Zellen, die seinen Endstationen entsprechen dürften. Allein obwohl sogar die Kernkörperchen sich mit aller Deutlichkeit darstellten, konnten doch keine austretenden Axencylinder bestimmt werden. Die beiden Arme divergieren etwas von dieser Stelle hinweg.

Verlauf. Oben schliesst sich der Tr. horiz. ventral an den Tr. valvulae ad commiss. sup. an, verlässt denselben jedoch sehr bald und steigt in schöner nach vorn offener Kurve hinunter, wendet sich zugleich mit zunehmender Schnelligkeit lateralwärts und gelangt so zu seinem ventralen Teile. Dieser verläuft nun genau „horizontal“ (d. h. equatorial zu dem Tuber ein). Er biegt so schnell nach der Medianebene, dass er sich auf einer ganzen Reihe von

Sagittalschnitten nur als kurzes zerschnittenes Fragment von elliptischer Form präsentiert. Der Querschnitt ist jedoch rund. Hierüber belehrt uns sowohl das Studium von frontalen Schnitten, als auch die Abnahme der Differenz zwischen den beiden Brennpunkten unserer Elipse.

Verhältnis zum Nucl. rotundus. Ich bin an Händen eines Cyclopterus und Schleienpräparates in der Lage, die Art des Herantretens unseres Bündels an den runden Kern genau zu beschreiben. Auf der Dorso-frontalen Seite des N. r. heben sich einige Fasern der Markhülle von dieser ab und legen sich an den herannahenden Tractus an; von den grösseren Zellkörpern des Kerns treten einige zu seinem Empfange vor und bilden einen kleinen Conus. Hiebei weichen zwar die Fasern etwas von einander und es werden mehrere der Zellklumpen von ihnen umfasst, Anastomosen aber konnten nicht gesehen werden. Auch sonst verhält sich das Bündel recht isoliert und scheint auf seinem ganzen nun folgenden Zuge durch den Kern nicht viel Einbusse an Fasern zu erleiden, ebensovienig einen Zuschuss zu erhalten.

Beim Verlassen des Kerns wird kein Conus gebildet, sondern im Gegenteil eine eigentümliche Formation geschaffen, die an einen Hylus erinnert und die ich auf Fig. 1, Taf. I vom Barsch abbilde. Die Markhülle des N. rot. nimmt ihren Ursprung hauptsächlich aus Fasern der ventralen Teile der Lob. lat. und ihrer medianen Kontaktzone. Aus diesen Gegenden caudal von den Lobi mediani, über und rings um den oberhalb von diesen gelegenen Kern (s. pag. 27) sammeln sich massenhaft Fasern; sie sind markweiss, auf *Weigert*-Präparaten daher schwarz und haben den Namen Substantia s. nidulus nigr. veranlasst. Sie convergieren und bilden einen kurzen Stiel, der in die „Knospenhülle“ des N. r. in dorsofrontaler Richtung übergeht (Barsch). Eine letzte Verbindung des N. r. kommt folgendermassen zu Stande:

Von einem zwischen den äussern und innern Fasern des Tract. nervi II gelegenen Kern¹⁾ (N. corp. genicul. s. str.) der histologischen Struktur grosse Aehnlichkeit mit der des runden Kernes zeigt, geht ein kompakter, starker Strang ventrocaudaler Richtung direkt nach dem N. r. und verflucht sich mit dessen Faserhülle. Er besteht deutlich aus zwei Partien gegen *Weigert'sche* Hämatoxylinfärbung verschiedenen Verhaltens. Die dorsale ist weniger markhaltig und bleibt hellbräunlich. Den beiden Hälften des Stranges entspricht auch hier eine Zweiteilung des Kernes, dem sie den Ursprung verdanken. Die Aufsplitterung der Fasern in diesem — die Lage ist übrigens bedeutend lateraler als die des N. r. — ist eine typisch regelmässige; ich kann aber die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass auch Fasern des Opticus in ihn eintreten. Letzterer umzieht den ganzen Körper, der bei *Leuciscus*²⁾ dem „runden Kern“ nicht an Rundung nachsteht, in kurzen, unregelmässigen Bögen, so dass dem Beobachter viele der Faserfragmente des Kernes aus dieser zu stammen scheinen. Ueber diese wichtige Frage erhoffe ich Aufschluss von der *Gudden'schen* Degenerationsmethode.

Im N. r. schliesst sich dieser Zug nach seinem Eindringen teilweise an den Trac. horiz.-Bogen an.

Das Lagenverhältnis dieses Tract. zur Umgebung ist folgendes: Es steigt im allgemeinen unter ähnlichem Winkel wie das Vorderhirnbündel dorsalwärts an. Es liegt jedoch in anderen paramedianen Ebenen (distaler) und divergiert frontalwärts bis zu den corpp. geniculata, während dagegen das Vorderhirnbündel dasselbe in entgegengesetzter Richtung thut. Ersteres erreicht sein Maximum von Distalität im Kern zwischen den Opticusfaserchen. Letzteres dagegen —

¹⁾ Der Kern selbst und sein interessantes Verhalten wurde bereits auf pag. 26 und ff. geschildert.

²⁾ Nur bei Cyprinoiden ist dieser zwischen den Opticuswurzeln liegende Kern ausgebildet.

abgesehen von den Auffaserungen im Cerebrum — in den Gegenden hinter dem grauen Trichter.

Unser Tractus liegt distal vom Zug zu der Comm. horizont. und den vordersten Dependenzen des hinteren Längsbündel, dagegen ziemlich in derselben Medianebene wie das *Meynert'sche* Bündel, d. h. es würde nicht mehr von diesen beiden Armen umfasst werden.

Dorsal ist er vom Tract. ad. comm. horiz. und den H. L. B. und vom V. H. B. begrenzt.

Beim Barsch¹⁾ zieht sich der N. r. bedeutend mehr gegen das corp. genic. hinauf, der Trac. zu demselben ist kurz, stark und dicht geworden; noch mehr nähern und verschmelzen die beiden Kerne bei *Cyclopterus*, bei dem der „runde Kern“ Walzenform annimmt und sich bis in das Gebiet der Opticusfasern hinauf erstreckt.

Auch beim Aal ist die Form eine viel gestrecktere und das Bündel viel gedrängter. Zwei Abteilungen sind auch bei den angeführten Fällen zu unterscheiden, und stets liegt die markreichere Fasermasse ventral von der Andern.

Fasciculi retroflexi.

Synon. *Meynerts*-Bündel treten zwar in keine nähere Beziehung zu den L. inf., doch werden sie uns dann und wann zu topographischen Zwecken wichtig.

Ich kann durchaus der Beschreibung beistimmen, die *Edinger* von ihnen gegeben hat; sie werden vor- und abwärts gestreckten Armen, deren Hände sich durch die Finger miteinander verflechten, verglichen. Die Biegung, die dem Ellbogen entsprechen würde, ist in unseren Fällen stets deutlich ausgeprägt (sie soll nur bei der Maus bei den Säugetieren fehlen. 28.) Jeder der beiden Arme ist stets zweifach, sie umfassen die hintere Längsbündelformation teilweise, und bilden schöne Kreuzungen in der Sagittalebene mit den Bindearmen.

¹⁾ Dieses Verfahren wurde auf pag. 28 schon auseinandergesetzt

Opticus.

Der zwei Wurzeln des opt., in dessen Gabel das Corp. genic. gelegen ist, wurde oben schon gedacht, ich halte für wahrscheinlich, dass er Fasern in dasselbe hinein sendet.

Der opt. durchbricht, durchschiesst, durchflieht das basale Vorderhirnbündel in charakteristischer Weise. Er gelangt oft in dichten Schwärmen scharf gebogener Fasern bis nahe an den N. r. (obere Teil desselben), ohne auf diese direkte Weise mit ihm irgend eine Anastomose einzugehen. Hingegen muss ich trotzdem, im Gegensatz zu fast allen neuern Autoren, durchaus für die Communication des nerv II mit den L. inf. eintreten und zwar mit den ventroproralen Regionen vor dem N. r. Ein feines, dünnes, aber intensiv schwarzes Bündelchen löst sich vom opt. unter dem Genuculaturn, biegt in einem sanft nach oben gewölbten Bogen medial und ventral aus; es ist auf fünf von 60 μ dicken Medianschnitten zu verfolgen. Es verschwindet unter der Markhülle des N. r. Auch hier hoffe ich eingehendere Resultate von Exstirpationsversuchen nach *Guddens* Methode. (Taf. II, Fig. 1; Tr. opt. ad N. r.)

Der Tract. opt. trennt das basale von dorsalen Vorderhirnbündel.

Die postoptischen Commissuren.

In der von *Edinger* pars commissuralis genannten Vorderwand des Trichters finden reiche und charakteristische Kreuzungen statt. Ich habe der

Commissura horizontalis

schon erwähnt; sie liegt dicht an der vordern Peripherie, etwas caudal und ventral vom Opticus. Sie ist die ventralste dieser Commissuren, deren wir je nach den Ansprüchen, die wir an morphologische Differenzierung stellen, mehrere unterscheiden können. (Fig. 1, Taf. I.)

Commissura transversa

die von *Edinger* als transversa bezeichnete und der *Meynert*-schen Commissura homologisierte, liegt zwischen der Kreuzung des Sehnerven und der comm. horiz. drinnen. Wir sehen sie bedeutend mächtiger, und ihre Fasern mehr gelockert, als es bei letzterer der Fall war. Ihr Tract. steigt auf der lateralen Seite der Vorderhirnbündel empor, kreuzt dieselben in parasagittaler Ebene beinahe rechtwinklig, erhebt sich seitlich vom N. r. bis in den Thal. opt. hinauf und verschwindet dort und in den basalen Teilen des hinteren Mittelhirns, wo ich Fasern in Zellen endigen sah (*Barsch*). Diese Faserzüge alle sind stark markhaltig und widerstehen dem Silberverfahren. Ob dies bei Embryonen auch der Fall ist, haben spätere Versuche zu erweisen. Dagegen gelang es mir, im Gehirn von *Petromyzon* eine bedeutende Anzahl Kreuzungsfasern aufs Schönste darzustellen, die sich der Färbung unzugänglich erwiesen hatten.

Opticusfasern

bildeten in einer ganzen Anzahl ventral vom Austritt der beiden Opticusäste eine Kreuzung. Diese Decussation ist die markhaltigste von allen in der pars commissuralis vorkommenden.

Decussation der Mantelbündel.

S. *Guddens* Commissur s. C. transversa Halleri s. Comm. postoptica entsteht caudal vom Opt., sie wird von *Edinger* als Comm. postoptica beschrieben und zwischen die Züge des Opticus und des basalen Vorderhirnbündels verlegt. Sie „entsteht dorsal und kreuzt caudal vom Chiasma und direkt ventral von der Dec. transversa“. Ich nehme an der betreffenden Stelle allerdings eine starke Kreuzung wahr, ohne indessen im Stande zu sein, dieselbe vom Verlauf des Trac. ad comm. transv. s. *Meynerts* zu trennen.

Vorderhirnbündel.

Dieser gelatinöse, kräftige Zug war in allen von mir untersuchten Specien sehr deutlich, am besten beim Barsch, wahrzunehmen. Hier zerfällt er, wie Sagittalschnitte mit grosser Klarheit zeigen, in mindestens zwei deutliche Abteilungen: einen aus den mehr ventralen Parteen kommenden und einen dorsalen, kleineren, in Büschel zerfallenden. Ausserdem pflegt sich unser Bündel in mehrere deutliche Stränge grösseren und kleineren Kalibers zu zerlegen, in deren Vorkommen jedoch jede Constanz zu fehlen scheint.

Das dorsale Bündel, das sich durch enges Aneinanderlagern der Fasern auszeichnet und sich scharf abhebt, jedoch an Ausdehnung ganz bedeutend hinter den ventralen Geschwistern zurücksteht, dürfte Anknüpfungspunkte zur Vergleichung mit jenem „Mantelbündel“ des Selachiergehirns (*Edinger*) bieten.

Die Fasern nehmen den ganzen Pendunculus des Vorderhirns ein, und entspringen in Zellen des Vorderhirns. Ich kann durchaus nicht mit derselben Sicherheit, wie *Herrick*, für ihre Endung in peripheren Zellen eintreten. Nach einem Verlaufe unter dem Corp. geniculatum, der mannigfach durch Opticusfasern durchschossen ist, biegt allerdings ein Teil des Bündels lateral aus. Für eine beträchtliche Partie der Uebrigen aber konnte ich mit Sicherheit ihr Eingehen in das centrale Ventrikelgrau constatieren. Namentlich für einige starke Fasern der medialen Parteen, die sich insbesondere bei *Leuciscus* scharf abhoben.

Ob sich diese Fasern als Axencylinder an die Zellen anlegen, oder ob die Verbindung auf eine andere Weise zu Stande kommt, — darüber erhielt ich keine genügende Sicherheit.

Die Fasern des dorsalen Bündels durchschliessen ebenfalls den Tr. opt., sie scheinen ebenfalls einige Fasern der peripheren Schicht aufzunehmen und präsentieren sich an diesen Stellen als ein enorm unregelmässiges Gewirre.



Embryologischer Teil.

Einige Serien von Embryonen liessen mich zu Notizen über die Entwicklungszustände der uns interessierenden Teile gelangen. Ich kann mir nicht versagen, diese Ergebnisse hier zusammenzustellen; meine wenigen Präparate sind folgende:

	Länge	Schnittdicke	Färbung
Forelle	10 mm	sagitt.	Alauncarmin
"	10 "	transvers.	Borax carm. + bleu de Lyon
"	15 "	sagitt.	Nigrosin
"	20 "	transvers.	"
"	15 "	horiz.	Boraxcarmin
Leuciscus	15 "	transvers.	"
"	15 "	"	"

Die embryonalen Stadien des Fischgehirns wurden wohl am besten von *Rabl-Rückhart* (17) untersucht. Seine Beobachtungen sind Zwecken der Vergleichung gewidmet und betreffen hauptsächlich die Deutung von Vorder- und Mittelhirn. *Goronowitsch* (pag. 456—458, 23) macht mehrere Angaben über die Entwicklung des Gehirnrohres. Die Sätze, in die er seine Resultate über das Gebiet des Lob. infundibuli zusammenfasst, lauten: „Das späte Erscheinen des Lob. infundibuli (18. Tag) dokumentiert diesen Gehirnabschnitt als einen neuen phyletischen Erwerb. Er ist eine sackförmige Ausstülpung der Basis des primitiven Vorderhirns, wie ihn *Götte* aufgefasst hat, und ist relativ kein primitives Organ.“

Ausserdem habe ich folgendes beizufügen: Im Stadium von der Forelle zeichnen sich die Ventrikel der Lobi inferiores durch grosse Weite aus; sie stellen dünnwandige Hohlblasen vor. Auch die Ventr. lob. median. sind gross und weit; sie scheinen unpaarig angelegt zu werden.

Mit fortschreitendem Wachstum kommt bei der Zunahme der unteren Lappen vor allem die der caudalen Wände der Lobi laterales in Betracht. Da denselben Platz zur Ausdehnung gegeben ist, überflügeln sie die Medianen bald bedeutend und drängen sie in die Tiefe. Das Stadium 25—27 mm eignet sich zu einer klaren Einsicht in den Aufbau der Lobi inferiores am allerbesten. Es sind in ihnen die wesentlichen Formen noch nicht durch Entwicklung dicker Wände verwischt. Mit der Entstehung der medianen Lappen hängt diejenige des Sacc. vasc. enge zusammen.

Der Nucleus rotundus ist beim Stadium von 27 mm schon in Gestalt einiger grösserer Zellen angelegt, doch war es mir nicht möglich, näheres über die ihm zukommende Struktur zu beobachten: Dieselbe schien noch nicht mit der des Nucleus rotundus im ausgewachsenen Gehirn übereinzustimmen.

Die Anwendung der Silbermethode auf Embryonen, von der ich mir manches verspreche, muss bis zur Beschaffung von geeignetem Material verschoben werden. Auf zu kleine Embryonen erwies sich das Verfahren ungeeignet; dieselben werden viel zu intensiv geschwärzt und liessen keine Détails erkennen.

Was die Entstehung der Neuroblasten betrifft, so sind die His'schen Resultate zu bestätigen. Im Embryo von 27 mm liegen in dicker Schicht um die Ventrikel angeordnet stark färbbare Zellen, in denen deutlich die Mitosen zu erkennen sind. Zwei Nervenschwärme dringen gegen den Thalamus opticus hin, vor. Die Rinde ist in der Entstehung begriffen. Je weiter wir nun rückwärts schreiten, desto mehr nimmt die Umkleidung der seitlichen Ventrikel an relativer Mächtigkeit zu, bis beim Embryo von 11 mm

die gesammte untere Wand des Seitenlappens aus dicht-geschaarten Nervenzellen besteht und die graue Centralsubstanz in die graue spätere Rindenschicht übergeht. Die Entwicklung der grauen Substanz dürfte sich also in folgende Sätze fassen lassen:

Vorerst sind der Trichter und die Ventrikel der Lappen von gleichmässigen epithelialen Lagern umgeben; der Gang der beginnenden Zellvermehrung ist natürlich dort am lebhaftesten, wo der Ausdehnung der Elemente die grösste mechanische Möglichkeit gegeben ist: In den Wänden der Lappen. Hier können sich die schnell an Zahl zunehmenden Zellen am besten entfalten. Ausserdem erhalten sie durch ein reichlich verzweigtes Blutgefäss, das im Seitenventrikel verläuft, viele Nahrung. Sie werden durch eindringende Massen von weisser Substanz in eine stärkere Rinden- und eine schwächere Centralschicht geschieden, wie an Präparaten von der Forelle 17 mm deutlich zu verfolgen ist. In den Wänden des Trichters wird keine Rinde gebildet, wogegen das centrale Grau stärker entwickelt ist. (Vergl. Fig. 3, Taf. I.)



Deutung der Teile.

Nicht manche Organe mögen so lange der Homologisierung unzugänglich geblieben sein, wie das Hirn der Fische. Dies äusserte sich in einem unglaublichen Auseinandergehen der Ansichten. So konnte z. B. (*Miclucho-Maclay* (6) das von uns unangezweifelte Cerebellum als Mittelhirn deuten, während der Lob. opticus successive als Vorderhirnhemisphären (1), als Thalamus opt. (3), als Vierhügel (2), als Zwischen-Mittelhirn (4) und als Lobi ventriculi III. (5) gegolten hatte.

Ueber die Registrierung der verschiedenen Auffassungen der Lobi inferiores vergleiche den historischen Teil, dieselben erwiesen sich mit der zunehmenden histologischen Kenntnis als unzureichend. *Chatin* (24) versuchte in einigen Ganglien der Infundibularwand der Säugetiere die Homologa der Lob. inferiores zu sehen. Dazu ist nach all dem gesagten wohl kein Commentar mehr zu geben:

1. Es ist gewagt, solch complizierten Gebilden einfache Ganglien einer ganz entfernten Tierklasse gleich zu setzen.

2. Auch in der Infundibularwand der Fische treffen wir solche Ganglienkerne.

3. Der Faserverlauf ist so vielseitig, wahrscheinlich aber auch so selbständig ausgebildet, dass er nicht unzweideutig zur Homologisierung benützt werden kann.

Ich sehe mit *His* (27) und *Herrick* (29) die Lobi inferiores, speziell die Laterales als Aussackungen der hintern Tuberwand und des Zwischenhirnbodens an; in demselben

entwickelt sich ein eigenes compliziertes System von verschiedenartigen Neuronen. Für die im Commissurenteil gelegenen Gebilde sind Homologa mit Sicherheit zu finden; der caudale scheint für sich zu stehen. Die Frage des Nucleus rotundus ist für mich ungelöst.

Die Vergleichung der Mamillarhöcker mit den Lobi mediani durch *Herrick* scheint mir trotz des durch diesen Autor hinein verfolgten Bündels nicht plausibel. In unserm complizierten Gebiet dürften sich doch gar viele Verhältnisse entwickeln, die nur einer Convergenz die etwaige Ähnlichkeit verdanke. Ferner hebe ich besonders den völligen Mangel von Kernen in den „Mamillaria“ *Herricks* hervor. Ausserdem die grosse Unregelmässigkeit ihres Vorkommens bei den untersuchten Arten. Ueberdies scheinen mir dieselben zu ventral zu liegen. Können nicht ebenso gut andere jener Kerne in der Tuberwand oder jener hintere Kern (p. 50) der Lobi inferiores den Corpora mamillaria entsprechen, wenn man dieselben durchaus finden will? Ob aber dieses Gebilde mit seinen circa fünf Ganglien, schon bei dem Verbindungsgliede der Teleostier und Amnioten angelegt waren, darf mit Recht vielfach überlegt werden.

Es sei hier beiläufig erwähnt, dass mir die Angabe von Ichthyophis (30. pag. 376), dass zwischen den Lobi laterales eine kleine Zwischenfalte auftrete, die *Burckhardt* „mit der Ausbildung der Lob. inf. zusammenhängend“ erklärt, vielleicht auch hieher zu gehören scheint. Dagegen zeigt das Zwischenhirn der Selachier noch eine viel deutlichere Gliederung des Lobus infundibuli, während dasjenige von Petromyzon ganz unpaarig in Gestalt eines bauchigen Trichters nach hinten und unten zieht.


Schlussbemerkung. Leider war es mir noch nicht möglich, Versuche, die nach der *Gudden'schen* Methode der Operation und Exstirpation (an jungen Tieren) begonnen wurden, zu verwerten. Dieselben, sowie andere Experimente, durch welche die Entwicklung des Organs beeinflusst würde, lassen die Hoffnung hegen, auf exaktem Wege dem Verständnisse nicht nur der Formen, sondern auch der diese bedingenden physiologischen und physikalischen Motive näher zu kommen.



Litteraturverzeichnis.

1. **Haller.** 1768. Opera Minora anat. argum. III. p. 200.
2. **Arsaki.** 1815. De piscium cerebris.
3. **Treviranus.** 1820. Verm. Schriften III. p. 44.
4. **Baer.** 1837. Entw. der Tiere. Bd. IV. p. 305.
5. **Müller.** 1835. Physiologie. p. 109.
6. **Micluch-Maclay.** 1870. Beitr. zur vergl. Neur. d. W.-T.
7. **Philipeaux et Vulpian.** 1854. Compt. rend. p. 336.
8. **Stieda.** 1868. Stud. ü. d. C. N. S. der Knochnf. Z. f. 41. Zo. XVIII.
9. **Freud.** 1877. Ueb. d. Ursprung d. L. W. bei Ammocoeteo.
10. **Sanders.** 1878. Philos. Transact. of R. S.
11. **Klaatsch.** 1850. De cerebris piscium ostacanthorum aquam nostram colentium.
12. **Forel.** 1877. Untersuchungen über die Haubenregion. Archiv für Psychiatrie. Bd. VII.
13. **Fritsch.** 1878. Untersuch. über d. feinem Bau d. Fischgehirns.
14. **Mayser.** 1882. Vergl. anat. Studien über das Gehirn d. Teleostier. Z. f. wi. Zo. XXXVI.
15. **Baudelot.** 1883. Leçons sur l'anat. comp. du cerveau des poissons.
16. **Ahlborn.** 1883. Untersuchungen über das Gehirn der Petro-myzonten. Z. f. wi. Zoo. 1883.
17. **Rabl-Rückhard.** 1885. Zur Deutung und Entwicklung des Geh. der Knochenf. A. f. An. und Ph.
18. — Das Gehirn der Knochenfische. Biol. Centralblatt. 1885.
19. **Fusari.** 1887. Feinere Anatomie des Geh. der Teleostier. Intern. Monatschr. 1887.
20. **Bellonci.** 1888. Z. f. w. Zoo. 1—46. Nerv. opt.
21. **Oyarzum.** 1889. Ueber den feinen Bau des Vorderhirns d. Amphib. Z. f. micr. Anat.
22. **Ussow.** Arch. de biologie. 1889. pag. 649/50.

23. **Goronowitsch.** 1888. Das Gehirn und die Cranialnerven von *Acipenser ruthenus*. *Morphol. Jahrbuch.* Bd. XIII.
24. **Chatin.** Sur les homologues des lobes inf. *Compt. rend.* 1889. pag. 628.
25. **His.** 1889. Die Neuroblasten und ihre Entstehung im embryonalen Mark. *Arch. f. Anat. und Physiol.* 1889.
26. — Histogenese und Zusammenhang der Nervelemente. *Ebenda.* Suppl. 1890.
27. — 1889. Entwicklung des Vorderhirn.
28. **Honegger.** 1891. Untersuchungen über den Fornix. *Recueil zool. Suisse.*
29. **Herrick.** 1891/92. Aufsätze über das Tel.-Gehirn im *Journal of comp. Neurology* bes. in der Juni-Nummer 1892 (u. *Anat. Anz.* 1892.)
30. **Burckhardt.** Untersuch. am Hirn und Geruchsorgan von Tritonen und Ichthyophis. *Z. f. w. Zo.* 1891.
31. **Edinger.** 1892. Das Zwischenhirn der Selach. und Amphibien, *Verh. der Senkenb. Gesellschaft.* Frühling 1892.
32. **Gaskell.** Vertebrates from a crustaceanlike ancestor. *Journal of micr. science* 1890.



Figurenerklärung.

Tafel I.

1. Horizontalschnitt durch den Lobus inferior vom Barsch. Nach vorne und unten geneigt. Vergr. 100.
2. Horizontalschnitt durch den Lob. inf. von *Engraulis*. Vergr. 60.
3. Dasselbe. Tiefer gelegener Horizontalschnitt.
4. Rindenzellen aus dem Lobus lateralis. Golgi.
5. Epithelzellen aus dem Ventriculus lateralis. Golgi.
- 5a Epithelzellen aus dem Trichter. Golgi.
6. Zelle aus dem Centralgrau.
7. Eigentümliches Stützgewebe aus den proralen Teilen der lobi laterales.
p = peripherie.

Tafel II.

1. Der Faserverlauf des Gehirns des Teleostier ohne die mit dem Nucleus rotundus in Verbindung tretenden Bahnen. Halbschematisch.
2. *Leuciscus*. Nucleus rotundus. Tractus horizontalis und Opticus.
3. *Cyclopterus* dasselbe.
4. Zellen aus dem Nucleus rotundus. Immersion.
5. Ein Teil aus der Gehirnrinde von *Leuciscus*, Lobus inferior. Golgi.



Zeichenerklärung.

Ch.	= Chiasma.
Com. p.	= Commissura postoptica.
C. tr.	= Commissura transversa.
H.	= Kreuzungen der Haube.
HLBF.	= hintere Längsbündelformation.
L. l.	= Lobi laterales.
MB.	= Meynerts Bündel.
M. h.	= Markhülle desselben.
N. r.	= runder Kern.
Opt.	= Opticus.
S. v.	= Saccus vasculosus.
Tr. hor.	= Tractus ad comm. horizontalem.
Tr. n. r.	= Zug zum runden Kern.
V. l.	= Ventriculi laterales.



Tafel 1.

